



دانشگاه علوم پزشکی قزوین  
دانشکده دندانپزشکی  
جهت دریافت دکترای دندانپزشکی

موضوع

**بررسی آماری میزان فراوانی و عوامل مؤثر  
در ایجاد Dry socket در بخش جراحی  
دهان و فک و صورت**

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  
(دی ماه ۱۳۸۰ تا دی ماه ۱۳۸۱)

به راهنمایی استاد ارجمند: جناب آقای دکتر منصور خراسانی

نگارش: فریبا رضوی

سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۲

## چکیده

درای ساکت (DRY SOCKET) یکی از علل بروز درد تأخیری بعد از خارج کردن دندانها است. این عارضه علیرغم کاربرد تکنیک دقیق و روش آسپتیک (aseptic) و با وجود توانایی و مهارت جراح، ممکن است ایجاد شود.

علائم این عارضه معمولاً ۳ تا ۴ روز پس از خارج کردن دندان آغاز می‌شود و شامل: درد شدید منتشر شونده، فقدان لخته خون در حفره آلوئول و احساس طعم و بوی نامطبوع می‌باشد.

درای ساکت یا حفره خشک، عارضه‌ای است که لخته خون در حفره آلوئول وجود ندارد. ممکن است در ابتدا لخته تشکیل شود، ولی بعد تجزیه شده و از بین برود. علت درد شدید، وجود کینینهای (Kinins) موضعی است که در اثر فیبرینولیز لخته خون، تشکیل شده و باعث تحریک شدید پایانه‌های عصبی ناحیه می‌گردند.

به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد اتیولوژی این عارضه و به منظور تعیین میزان شیوع درای ساکت در دندانهای کشیده شده و نیز بررسی تعدادی از عوامل که به عنوان علل مستعد کننده این عارضه شناخته شده‌اند، در بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین این تحقیق صورت گرفت.

در این بررسی عواملی شامل سن، جنس، نوع دندان کشیده شده، علائم عارضه، وارد شدن تراما حین کشیدن دندان، ابتلا به بیماری سیستمیک، مورد تحقیق قرار گرفت. بیماران خانم علاوه بر موارد فوق الذکر، از لحاظ بارداری و مصرف قرص ضدبارداری

نیز بررسی شدند.